



ULTRA MR

Ultra Precyzja w obrazowaniu Twojego ciała.

Pieczęć jednostki kierującej

Miejscowość i data

Rodzaj badania

SKIEROWANIE NA BADANIE MR

Dane Pacjenta:

Imię

Nazwisko

Data
urodzenia

PESEL

Telefon

Adres

Rozpoznanie

Kod ICD-10

Co badanie ma wyjaśnić

Dotychczasowe badania diagnostyczne

☐

USG

☐

RTG

☐

TK

☐

MR

Podpis i pieczętka lekarza
z numerem prawa wykonywania zawodu

Wyrażam zgodę na badanie i dożylnie podanie kontrastu

Data i podpis Pacjenta lub opiekuna

Uwagi dla lekarza kierującego na badanie MR

1. Decyzję o wykonaniu i przebiegu badania, w tym o konieczności podania środka kontrastującego dożylnie, podejmuje lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.
2. W świetle obowiązujących przepisów wymagana jest zgoda Pacjenta na wykonanie badania MR. Prosimy o dopilnowanie tej formalności (podpis Pacjenta na skierowaniu).
3. **Przed badaniem w przypadku, którego wskazaniem będzie podanie środka kontrastowego, Pacjent powinien okazać wyniki badania krwi w kierunku określenia poziomu kreatyniny w surowicy krwi (wynik jest ważny 7 dni u osób z zaburzeniami czynności nerek, u osób zdrowych 14 dni)**
4. Przeciwwskazaniem do badania MR może być ciąża - u pacjentek ciężarnych należy każdorazowo rozważyć wykonanie badania.
5. **Badanie MR nie może być wykonywane u pacjentów z metalicznym ciałem obcym (w obrębie gałki ocznej lub innych tkanek miękkich), z wszczepionym elektrostymulatorem serca lub implantem ślimakowym.**

Przygotowanie do badania MR

Pacjent zgłaszający się na badanie MR powinien przynieść ze sobą:

- dowód osobisty,
- poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis+ płyty CD), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala,
- osoby niepełnoletnie (z dokumentem tożsamości) zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym, legitymującym się oryginałem dokumentu, uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim,
- aktualny wynik poziomu kreatyniny we krwi (wynik jest ważny 7 dni u osób z zaburzeniami czynności nerek, u osób zdrowych 14 dni) - **przy badaniach z podaniem środka kontrastującego.**

Badanie MR bez podania środka kontrastującego:

- Wykonanie badania nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania.
- Należy zmyć makijaż i nie stosować lakieru do włosów (MR głowy).
- Należy założyć luźne, wygodne ubranie, bez metalu w okolicach badania.

Przed badaniem MR z podaniem środka kontrastującego:

- Należy nie jeść i nie pić przez dwie godziny - badanie głowy

Przed badaniem MR jamy brzusznej lub/i miednicy mniejszej:

- Dzień przed badaniem należy przyjąć 3x2 tabletki Espumisanu oraz 3x2 tabletki Buscopanu (leki dostępne bez recepty), wieczorem w przeddzień badania lekkostrawna kolacja.
- W dniu badania dwie godziny przed: 2 tabletki Espumisanu, 2 tabletki Buscopanu, nie pić.

UWAGA: w dniu badania należy pozostawać na czczo. Jeśli badanie MR jamy brzusznej lub/i miednicy mniejszej jest w godzinach popołudniowych, należy zjeść lekki posiłek nie później niż 6-7 godzin przed badaniem.

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY PODANIA GADOLINOWEGO ŚRODKA KONTRASTOWEGO PRZEZNACZONY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ LEKARZA KIERUJĄCEGO PACJENTA NA BADANIE

1. Umiarkowana lub ciężka reakcja na gadolinowy środek kontrastowy w wywiadzie ☐ Tak ☐ Nie
2. Atopia wymagająca leczenia w wywiadzie ☐ Tak ☐ Nie
3. Niestabilna astma w wywiadzie ☐ Tak ☐ Nie
4. Czy u pacjenta występuje schyłkowa niewydolność nerek (eGFR <30 ml/min/1,73 m²) lub czy pacjent jest poddawany dializom?..... ☐ Tak ☐ Nie
5. Czy u pacjenta występuje upośledzenie funkcji nerek (eGFR od 30 do 60 ml/min/1,73 m²)..... ☐ Tak ☐ Nie

Wypełnił(a)

Data:

Na badanie Pacjent powinien przynieść ze sobą wyniki badań MR, TK, RTG, USG.